

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ГУНА-БОВЕЛ

Состав лекарственного средства:

100 мл капель оральных содержат:

действующие вещества: Aloe D2 - 12,435 мл, Carduus marianus D2 - 12,435 мл, Chelidonium majus D2 - 12,435 мл, Collinsonia canadensis D2 - 12,435 мл, Rhamnus frangula D2 - 12,435 мл, Rheum D2 - 12,435 мл, Taraxacum D2 - 12,435 мл, Cholecalciferol D2 - 4,350 мл, Niacin D2 - 3,875 мл, Pantothenic acid D2 - 3,875 мл, Thiaminum hydrochloricum D4 - 0,039 мл, Alumina D6 - 0,044 мл, Alumina D8 - 0,044 мл, Bryonia alba D6 - 0,044 мл, Bryonia alba D8 - 0,044 мл, Colon suis D6 - 0,044 мл, Colon suis D12 - 0,044 мл, Colon suis D30 - 0,044 мл, Kalium carbonicum D6 - 0,039 мл, Kalium carbonicum D8 - 0,039 мл, Kalium carbonicum D12 - 0,039 мл, Natrum carbonicum D6 - 0,039 мл, Natrum carbonicum D8 - 0,039 мл, Natrum carbonicum D12 - 0,039 мл, Nux vomica D6 - 0,039 мл, Nux vomica D8 - 0,039 мл, Rectum suis D6 - 0,039 мл, Rectum suis D12 - 0,039 мл, Rectum suis D30 - 0,039 мл, Skatolum D6 - 0,039 мл, Skatolum D10 - 0,039 мл.

Вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 30% об. этанола.

мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма.

Капли оральные.

Прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета с запахом спирта этилового.

Название и местонахождение производителя.

Гуна С.п.а

Ул. Пальманова, 69, 20132 Милан, Италия.

Фармакологическая группа.

Комплексный гомеопатический препарат.

Показания по применению.

Симптомы, вызванные атоническими и спастическими запорами, дисбиозом, вздутием живота, нарушением функций толстого кишечника, синдромом раздраженного кишечника; при нарушениях функции печени вследствие нерационального питания; в комплексном лечении геморроя.

Противопоказания.

Нет.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Во время приема препарата желательнее отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых и острых продуктов, продуктов из свинины, кофе.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Нет опыта применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Следует учитывать, что препарат содержит спирт. В рекомендуемых дозах не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе с другими механизмами.

Дети.

Применяют детям в возрасте от 3 лет.

Способ применения и дозы.

Принимать натощак. Перед каждым приемом интенсивно взболтать 10-15 раз.

Взрослые и дети старше 12 лет: 10-15 капель 3 раза в сутки со столовой ложкой воды за 15 минут до еды или через час после еды в течение 2 месяцев. В начале лечения при необходимости получения быстрого результата рекомендуется прием по 10-15 капель 5 раз в сутки в течение 5-7 дней.

Дети 3-6 лет - 5-7 капель 3 раза в сутки (5 раз в сутки в течение первых 5 дней приема);

6-12 лет - 7-10 капель 3 раза в сутки (5 раз в сутки в течение первых 5 дней приема).

Курс лечения - 3 месяца.

Передозировка.

Не обнаружено.

Побочные эффекты.

Нежелательные влияния неизвестны. В случае появления каких-либо необычных реакций больному следует посоветоваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Взаимодействие пока неизвестна.

Особенности применения.

При запорах и колитах рекомендуется сочетать прием препаратов Гуна-Бовел и Еубиофлор. При запорах психосоматического генеза рекомендуется сочетать прием Гуна-Бовел с Гуна-Протистрес.

Срок годности.

5 лет. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре до 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 30 мл капель оральных во флаконе-капельнице в картонной коробке.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.